


PACIENTES ONCOLÓGICOS COM DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO POR COVID-19:

Uma coorte retrospectiva multicêntrica de nove centros oncológicos brasileiros



A chance de mortalidade varia amplamente conforme tipo de câncer, performance do paciente, idade avançada e comorbidades:

Em análise univariada:



- Pacientes com menos de 1000 linfócitos na admissão hospitalar têm **2,4X mais risco** que aqueles com linfócitos normais
- Pacientes debilitados têm **83% mais risco** que pacientes ativos (*performance status > ou = a 2)
- Pacientes hipertensos têm **72% mais risco**

Em análise multivariada:



Paciente com câncer de pulmão
2,6X mais risco



Pacientes com metástase pulmonar
2,9X mais risco



Pacientes com doenças coronarianas
3,8X mais risco


CONCLUSÃO



Pacientes com câncer podem ter maior risco de complicações e morte por covid-19. Entretanto, os pacientes devem ser avaliados de maneira individualizada pois o risco é maior em determinado grupo de pacientes.

PACIENTES ONCOLÓGICOS COM DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO POR COVID-19:

Uma coorte retrospectiva multicêntrica de nove centros oncológicos brasileiros



A chance de mortalidade varia amplamente conforme tipo de câncer, performance do paciente, idade avançada e comorbidades:

Em análise univariada:



→ Pacientes com menos de 1000 linfócitos na admissão hospitalar têm **2,4X** mais risco que aqueles com linfócitos normais

→ Pacientes debilitados têm **83%** mais risco que pacientes ativos (*performance status $\geq$ a 2)

→ Pacientes hipertensos têm **72%** mais risco

Em análise multiavaliada:



Paciente com
câncer de pulmão
2,6X mais risco



Pacientes com
metástase pulmonar
2,9X mais risco



Pacientes com
doenças coronarianas
3,8X mais risco

CONCLUSÃO



Pacientes com câncer podem ter maior risco de complicações e morte por covid-19. Entretanto, os pacientes devem ser avaliados de maneira individualizada pois o risco é maior em determinado grupo de pacientes.